



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی گل‌سار

بای پس عروق پا چیست و چگونه از خود مراقبت کنیم؟



تهیه: کارگروه آموزش بیماربخش جراحی ۲

تدوین: خرداد ۱۴۰۵

ایمیل بیمارستان

info@golsarhospital.ir

سایت بیمارستان

www.golsarhospital.ir

شماره تلفن: ۰۱۳-۳۴۹۰۰۰

آدرس: رشت - گل‌سار - بلوار سمیه

کد پمفلت: T۲-AC-۰۵

عوارض احتمالی

مانند هر عمل جراحی، بای پس عروق پا نیز ممکن است

عوارضی داشته باشد، از جمله:

- عفونت محل جراحی
- خونریزی
- لخته شدن خون
- بسته شدن مجدد رگ بای پس



در صورت مشاهده موارد زیر فوراً با پزشک

تماس بگیرید:

- تب یا علائم عفونت
- قرمزی، تورم یا ترشح از محل جراحی
- درد شدید یا افزایش ناگهانی درد پا
- سرد شدن یا بی‌حسی پا
- تورم شدید در پا یا محل عمل.



در صورت داشتن هرگونه سوال در زمینه مراقبت های منزل

با شماره تماس ۰۱۳-۳۴۹۰۰ داخلی بخش مربوطه تماس

حاصل نمایید.

منبع: برونر سودارت قلب و عروق ۲۰۲۰

مراقبت بعد از عمل بای پس عروق پا



مایعات کافی
بنوشید



محل زخم را
تمیز و خشک نگه دارید



به آرامی راه بروید
و فعالیت خود را
تدریجی افزایش دهید



تورم، قرمزی، درد یا
خونریزی را بررسی کنید
و در صورت مشاهده
به پزشک مراجعه کنید



از سیگار کشیدن
خودداری کنید



دستور پزشک خود را به دقت رعایت کنید
و در مراجعات دوره‌ای شرکت نمایید.



آمادگی قبل از جراحی بای پس عروق پا



1



ناشتایی ۸ ساعت
قبل عمل

2



داروهای مصرفی خود
به ویژه داروهای
رقیق کننده خون

3



دیابت، فشار خون یا
بیماری قلبی متماً
اطلاع دهید.

4



نتایج آزمایش ها و
مدارک پزشکی قبلی را
همراه داشته باشید.

5



قطع سیگار چند روز
قبل عمل



چرا بای پس

عروق پا انجام می شود؟



1

تنگی یا انسداد شدید عروق پا



2

درد شدید پا هنگام راه رفتن
یا در حالت استراحت



3

زخم های پا که بهبود
پیدا نمی کنند



4

کاهش جریان خون به پا



5

پیشگیری از آسیب بافت
یا قطع عضو



بای پس عروق پا با ایجاد مسیر جدید برای جریان خون، به بهبود علائم،
حفظ بافت و جلوگیری از عوارض جدی کمک می کند.

بای پس عروق پا چیست؟

بای پس عروق پا یک عمل جراحی است که برای درمان انسداد یا تنگی شدید عروق پا انجام می شود. در این روش جراح با استفاده از یک رگ سالم از بدن بیمار یا یک لوله مصنوعی، مسیر جدیدی برای عبور خون ایجاد می کند تا خون بتواند از اطراف رگ مسدود شده عبور کرده و به پا برسد.

مراحل انجام جراحی بای پس

بیمار تحت بیهوشی عمومی یا بی حسی نخاعی قرار می گیرد.

جراح یک برش در محل رگ مسدود شده ایجاد می کند.

یک رگ سالم از بدن بیمار (معمولاً از پا) یا یک گرافت مصنوعی به عنوان مسیر جدید استفاده می شود.

این رگ جدید به بالا و پایین محل انسداد متصل می شود تا خون از مسیر جدید عبور کند.

پس از اطمینان از جریان مناسب خون، برش ها بسته می شوند.

مدت زمان انجام

این جراحی معمولاً بین ۲ تا ۴ ساعت طول می کشد.