



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی گلساررشت

داروی ترولاک چیست و چه کاربردی دارد؟



تهیه: کارگروه آموزش بیمار بخش دیالیز

تدوین: خرداد ۹۵

بازنگری: خرداد ۱۴۰۵

ایمیل بیمارستان

info@golsarhospital.ir

سایت بیمارستان

www.golsarhospital.ir

آدرس: رشت - گلسار - بلوار سمیه

شماره تلفن: ۰۱۳-۳۴۹۰۰

کد پمفلت: ۱۳-AC-۱۴T



در صورت داشتن هرگونه سوال در زمینه مراقبت های منزل
با شماره تماس ۰۱۳-۳۴۹۰۰ داخلی بخش مربوطه تماس
حاصل نمایید.

منبع: بروشور دارو

لازم به ذکر است محلول فوق هیچگونه عوارض دارویی نداشته و تا زمانیکه بیمار جهت درمان از ترولاک استفاده نماید حساسیت باکتری و قارچ به ترولاک حفظ خواهد شد و بلافاصله بعد از استفاده از ترولاک اگر در داخل کاتتر گونه ای از آنها وجود داشته باشد در عرض ۲ تا ۲۴ ساعت از بین خواهد رفت و بیمار با همان کاتتر اولیه به درمان خود تا مدت طولانی ادامه خواهد داد. استفاده از ترولاک هم آثار درمانی بسیار مؤثر خواهد داشت و هم از نظر روحی و روانی بیمار وضعیت بسیار مطلوبی را طی کرده و دوران دیالیز خود را به بهترین شکل سپری می کند.

عفونت راه عروقی چیست؟

همانطوریکه استحضار دارید در درمان بسیاری از بیماران، نیاز به استفاده از کاتترهای عروقی مانند شالدون، پرمیکت، پورت، CVC از مراحل اولیه و شروع درمان در بیماران می باشد.

یکی از بزرگترین مشکلات در بیمارانی که از کاتترهای عروقی در درمان خود استفاده می کنند عفونت های ناشی از کاتتر می باشد این عفونت ها به علت وجود باکتریها، قارچها و ویروسها از طریق انتهای کاتتر که بیرون از بدن قرار دارد به داخل کاتتر نفوذ کرده و با علائمی مثل تب و لرز شروع شده و در نتیجه کاتتر بیمار عفونی می گردد که درمان آن شامل بستری شدن در بیمارستان، آنتی بیوتیک تراپی و گاهی تعویض کاتتر بوسیله جراحی می باشد. این روند باعث ایجاد عوارض دارویی، هزینه های بستری بیمار در بیمارستان، انجام جراحی های متعدد و کارگذاری کاتتر جدید و ... می باشد.



داروی ترولاک چیست؟

باتوجه به پیشرفت تکنولوژی در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی کمپانی **Tauropharm** آلمان ماده ای آنتی باکتریال به نام ترولاک تولید کرده است که نقشی بسیار حائز اهمیت و مؤثر در کنترل عفونت ناشی از کاتتر دارد.

محلول ترولاک شامل یک ماده آنتی باکتریال وسیع الطیف است که روی کلیه باکتریها و قارچها حتی در نوع مقاوم به درمان اثر کرده و مانع از بوجود آمدن عفونت های ناشی از کاتتر خواهد شد در ضمن ترولاک دارای خاصیت ضدانعقادی (هپارین+سیترات ۴٪) بودن و مانع از ایجاد لخته در انتهای کاتتر خواهد شد. در نتیجه تا زمانی که بیماران در انتهای درمان از محلول ترولاک برای بستن کاتتر آنها استفاده شود، کاتتر کارائی خود را حفظ خواهد کرد و عفونت ناشی از آن منتفی و مسئله لخته شدن و بسته شدن کاتتر پیش نخواهد آمد و طول عمر کاتتر بیمار را افزایش خواهد داد.

