



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی گلزار

سکته قلبی چیست و چگونه درمان می شود؟



تهیه: کارگروه آموزش بیماربخش مراقبت های ویژه قلب

تدوین: خرداد ۱۴۰۱

بازنگری: خرداد ۱۴۰۵

ایمیل بیمارستان

info@golsarhospital.ir

سایت بیمارستان

www.golsarhospital.ir

شماره تلفن: ۰۱۳-۳۴۹۰۰

آدرس: رشت - گلزار - بلوار سمیه

کد پمفلت: T12-AC-08

سکته قلبی چگونه درمان می شود؟

سکته قلبی نیاز به درمان فوری دارد:

- استفاده از داروهایی که به سرعت لخته های خون را حل می کنند(باید در عرض حداکثر ۱ تا ۳ ساعت پس از وقوع سکته قلبی مورد استفاده قرار گیرند)
- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی شریان قلب
- در مواردی که به درمان های بالا پاسخ ندهد با نظر پزشک پیوند شریان قلب (بای پس قلب)
- استفاده از سایر داروهای مورد نیاز شامل: (داروی ضد درد مخدر، داروهای تنظیم کننده ضربان قلب، داروهای تنظیم کننده فشارخون، داروهای افزایش دهنده قدرت انقباضی قلب، نیتروگلیسرین جهت گشاد کردن سرخرگها و افزایش خونرسانی قلب و...)



در صورت داشتن هرگونه سوال در زمینه مراقبت

های منزل با شماره تماس ۰۱۳-۳۴۹۰۰ داخلی

بخش مربوطه تماس حاصل نمایید.

منبع: برونر سودارت قلب و عروق ۲۰۲۰- هندبوک آموزش به بیمار ام کانابو- راهنمای پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی و عروقی / د. اکبر نیک پژوه

سکته قلبی چگونه تشخیص داده می شود؟

- علایم بالینی و شرح حال بیمار و بررسی تاریخچه سلامتی و بیماری
- نوار قلب
- آزمایش بررسی آنزیم های قلبی و سایر آزمایشات خونی
- آنژیوگرافی شریانهای قلب
- اسکن هسته ای قلب و MRI
- اکو کاردیوگرافی

اقدامات اولیه در برخورد با حمله قلبی کدام است؟

- در صورت احساس درد قلبی در خود یا یکی از اطرافیان سریعاً با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید.
- بیمار را در وضعیت راحت قرار دهید.
- از راه بردن بیمار خودداری کنید.
- در صورت عدم دسترسی فوری به ۱۱۵ با رعایت اصول انتقال درست (وضعیت نیمه نشسته) بیمار را به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کنید.



سکته قلبی چیست؟

یک وضعیت پزشکی بسیار خطرناک است که در آن عضله قلب به دلیل عدم دریافت خون کافی آسیب دیده و در نهایت می میرد. علت اصلی آن بسته شدن ناگهانی یا به تدریج شریان هایی است که به خود عضله قلب خون می رسانند.



علت سکته قلبی کدام است؟

- بسته شدن کامل یا نسبی شریان قلب توسط لخته خون
- تنگی یا گرفتگی شریان قلب

سکته قلبی چه علایمی دارد؟

- درد فشارنده، له کننده و خنجری در قفسه سینه
- این درد معمولا در حداقل فعالیت بدنی یا حتی در هنگام استراحت ایجاد می شود
- درد ممکن است به بازوها، شانه، گردن، فک و بالای شکم یا پشت انتشار پیدا کند و بیشتر از ۲۰ دقیقه طول می کشد و همراه با عرق سرد، تهوع و استفراغ، کوتاهی تنفس یا تنگی نفس، ضعف می باشد.



- ❖ بیماران دیابتی ممکن است در صورت ابتلا به آنژین ، درد شدیدی احساس نکنند.
- ❖ در افراد مسن هم ممکن است در فک احساس درد کنند و یا غش کنند.

عوامل خطرزای سکته قلبی کدامند؟

- کشیدن سیگار
- فشار خون بالا
- دیابت
- زندگی کم تحرکی
- جنس مذکر
- سابقه خانوادگی
- چاقی
- بالا بودن کلسترول بد خون و پایین بودن سطح چربی خوب بدن
- فشارعصبی مکرر
- مصرف مداوم غذاهای پر چرب

سکته قلبی چه عوارضی به دنبال دارد؟

- احساس مرگ قریب الوقوع
- نامنظم شدن ضربان قلب
- شوک قلبی
- تجمع مایع در شش ها
- التهاب پرده های دور قلب
- تشکیل لخته خون در سیاهرگ های عمقی
- نارسایی قلبی
- خطر حمله قلبی در آینده