



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی گلزار

ERCP (ای آر سی پی)

کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد آندوسکوپی

چیست ؟



تهیه و تنظیم : کار گروه آموزش بیمار آندوسکوپی

تاریخ تدوین: اذر - ۹۵

تاریخ بازنگری: پاییز ۱۴۰۵

ایمیل بیمارستان

info.golsarhospital.ir

سایت بیمارستان

www.golsarhospital.ir

آدرس: رشت - گلزار - بلوار سمیه

شماره تلفن: ۳۴۹۰۰-۰۱۳

T۲۰-AC-۰۱

شما چه چیزی را بعد از ERCP تجربه می کنید ؟

معمولاً تا ۶ ساعت بعد از ERCP ممکن است احساس باد کردن (نفخ شکم) یا دفع گاز را تجربه کنید که بعلت هوای وارد شده از طریق آندوسکوپ به مجرای گوارشی حین ERCP می باشد. می توانید بعد از ۶ ساعت رژیم معمولی را از سر بگیرید، مگر اینکه دستور دیگری توسط پزشک داده شود. بیشتر بیماران، روز بعد می توانند به فعالیتهای خود ادامه بدهند.

یاد آوری مهم: اطلاعات عنوان شده فقط

برای راهنمایی آمادگی عمومی در نظر

گرفته شده و پایه و اساس قطعی برای

تشخیص و درمان برای هر مورد خاص

نیست. بسیار مهم است که در مورد وضعیت

خاص خود با پزشک مشورت کنید

منبع: انجمن آمریکایی آندوسکوپی گوارشی

یک محافظ پلاستیکی محکم دندان در دهان شما برای پیشگیری از آسیب به دندانها و آندوسکوپ قرار داده می شود.

چگونه ERCP تشخیصی انجام می شود؟

در طول انجام عمل ERCP، پزشک یک آندوسکوپ مخصوص با لوله باریک و قابل انعطاف را از دهان، مری و معده به قسمت ابتدایی روده باریک - دوازدهه - عبور می دهد. سپس یک لوله پلاستیکی باریک و بلند که کاتتر نامیده می شود را از داخل لوله آندوسکوپ عبور داده سپس کاتتر را از طریق سوراخ پاپی، وارد مجاری صفراوی یا مجرای پانکراس می نماید. بعد از وارد شدن کاتتر به مجاری، ماده حاجب از طریق کاتتر به داخل مجاری تزریق شده و با اشعه X از مجاری و کیسه صفرا عکس گرفته می شود.

ERCP) اندوسکوپی رتروگرید

مجاری صفراویو لوزالمعده چیست؟

یک تکنیک آندوسکوپی مخصوص و مطمئن جهت بررسی کیسه صفرا، مجرای صفراوی و مجرای لوزالمعده (پانکراس) با کمک اشعه ایکس می باشد. مجرای که ترشحات کبد و کیسه صفرا را تخلیه می کند (مجرای پانکراس) نامیده می شوند. هر دو مجرا ترشحات خود را از محلی مشترک بنام پاپی در قسمت ابتدایی روده باریک یعنی دوازدهه یا اثنی عشر به داخل روده باریک تخلیه می کنند. اگر ERCP فقط برای گرفتن عکس از مجاری و کیسه صفرا انجام شود، ERCP تشخیصی است. در بیشتر موارد ERCP برای انجام اقدامات درمانی صورت می گیرد شامل: خارج کردن سنگ ها، استنت گذاری در مجاری صفراوی و... که در این صورت ERCP درمانی نامیده می شود.

چه آمادگیهایی برای ERCP لازم است؟

باید حد اقل ۶ ساعت و ترجیحاً تمام شب قبل از انجام ERCP برای اطمینان از اینکه معده شما خالی باشد، ناشتا باشید. خالی بودن معده برای مشاهده مجرای گوارش و همچنین پیشگیری از احتمال ورود مواد غذایی و مایعات در اثر استفراغ به ریه بسیار ضروری است

*باید دندان مصنوعی و زیور آلات را خارج کرد

باید پزشک خود درباره داروهایی که مصرف می کنید و هرگونه حساسیت و آلرژی که نسبت به داروها دارید صحبت نمایید. اگر به داروهای حاوی ید حساسیت دارید نیز به پزشک اطلاع دهید چرا که ماده حاجب مورد استفاده حاوی ید می باشد. اگر چه داشتن حساسیت از انجام ERCP جلوگیری نمی کند ولی در میان گذاشتن آن با پزشک قبل از انجام عمل بسیار مهم است..

*داروهای وارفارین، آسپرین و یا پلاویکس با نظر پزشک از یک هفته قبل از ERCP باید قطع شود.

*همچنین داشتن هرگونه مشکل قلبی یا ریوی و یا هر بیماری مهم را به پزشک اطلاع دهید.

*در دست شما یک راه وریدی با قرار دادن یک آنژیوکت در رگ ایجاد می شود. که شما می توانید از این طریق در حین ERCP داروهای مورد نیاز و سرم در یافت کنید.

اقدامات مورد انتظار در طول ERCP

چیست؟

پرستار ممکن است یک بی حس کننده موضعی در حلق شما اسپری نماید یا برای راحتی بیشتر شما آرام بخش وریدی تجویز کند. بعضی بیماران هم قبل از انجام عمل، آنتی بیوتیک در یافت می کنند. شما باید بر روی شکم، در تخت زیر دستگاه اشعه X دراز بکشید.