



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی گلزار

قبل از تصویر برداری رنگی چه آمادگی‌هایی لازم است؟



تهیه: کارگروه آموزش بیمار رادیولوژی

تدوین: پاییز ۱۴۰۳

بازنگری: خرداد ۱۴۰۵

ایمیل بیمارستان

info@golsarhospital.ir

سایت بیمارستان

www.golsarhospital.ir

شماره تلفن: ۳۴۹۰۰-۰۱۳

آدرس: رشت - گلزار - بلوار سمیه

T18-AC-01

پرتونگاری UGI (معده):

آمادگی‌ها:

- پس از نیمه شب چیزی نخورید و ناشتا باشد. (حداقل مدت زمان ۸ تا ۱۰ ساعت معده از غذا و مایعات باید خالی باشد).
- حتی از کشیدن سیگار و جویدن آدامس خودداری کنید زیرا ترشح غدد بزاقی معده باعث به وجود آمدن مایع در معده شده و در نتیجه تخلیه معده دچار تاخیر می شود.



منبع:

American College of Radiology (ACR):
Practice Parameters for General Radiography.


باریم سوآلو:

لوازم مصرفی مورد نیاز:

- دو بسته پودر سولفات باریم
- یک عدد لیوان و قاشق

آمادگی‌ها:

- ۸ ساعت قبل از انجام باریم سوآلو ناشتا باشید.



اروگرافی یا IVP:

اروگرافی یا (Intra venous Pyelogram) IVP نامی است که به تصویر برداری از دستگاه ادراری با تزریق ماده حاجب گفته می شود. در این روش، برای نشان دادن طرز کار لگنچه ها و حالب ها از اروگرافین استفاده می شود. این ماده از طریق داخل وریدی به بیمار تزریق می شود. بیمار باید شام ساده ای میل نماید و از داروهای ملین، شب قبل از گرافی که معمولا روغن کرچک است مصرف نماید تا روده ها از مدفوع خالی شده و شکم بیمار تمیز شود. روز گرافی بیمار باید ناشتا باشد.



لوازم مصرفی مورد نیاز:

- یک شیشه روغن کرچک
- چهار عدد قرص دایمتیکن جویدنی
- آمپول تزریقی ماده حاجب (ویزیپیک یا ...)

آمادگی ها:

- روز قبل از انجام رادیوگرافی از مصرف مواد غذایی نفاخ خودداری نمایید.
- برای نهار روز قبل، غذای سبک یا فقط سوپ ساده میل نمایید.
- ساعت ۶ عصر روز قبل، یک شیشه ۴۰ گرمی روغن کرچک کامل میل نمایید.
- پس از مصرف روغن کرچک، به میزان فراوان مایعات مصرف نمایید.
- ۴ عدد قرص دایمتیکن جویدنی به فاصله دو ساعت از یکدیگر هر بار دو عدد مصرف کنید.
- شب قبل شام یا غذای دیگر میل نکنید.
- از ساعت ۱۲ شب تا صبح روز رادیوگرافی ناشتا باشید.

باریم انما:

لوازم مصرفی مورد نیاز:

- چهار بسته پودر سولفات باریم
- یک شیشه روغن کرچک
- چهار عدد قرص بیزاکودیل
- یک عدد ژل لیدوکائین

آمادگی ها:

- از دو روز قبل از انجام گرافی از خوردن غذای نفاخ و سنگین پرهیز کنید. (بیمارانی که اجابت مزاج آنها دیر صورت می گیرد و یا دیابتیک هستند این مدت زمان طولانی تر خواهد شد).
- در نهار دو روز قبل از گرافی و روز قبل سوپ ساده مصرف کنید.
- یک شیشه روغن کرچک کوچک ساعت ۶ غروب قبل از رادیو گرافی بخورید و به میزان فراوان مایعات تا ساعت ۱۲ شب مصرف نمایید.
- شب قبل از باریم انما شام یا غذای دیگر (نوشابه یا شیر) میل نکنید.
- چهار عدد قرص دایمتیکن به فاصله دو ساعت از یکدیگر (هر بار دو عدد) ساعت ۸ شب قبل از انجام رادیوگرافی میل کنید.
- از ۱۲ شب ناشتا بمانید.

